

В настоящее время в отделе клинических исследований ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии проводятся исследования, в которых мы приглашаем принять участие Вас или Ваших детей.

Клиническое исследование препарата Лонгидаза® *

Если Вам от 18 до 80 лет, Вы перенесли новую коронавирусную инфекцию COVID-19 в течение прошедших 12 месяцев и лечились в стационаре, если Вы всё еще испытываете одышку или иные симптомы, ограничивающие повседневную деятельность, Вы можете обратиться к нам для получения информации о клиническом исследовании и возможности участия в нем с целью реабилитации легочной функции после перенесенной COVID-19.

В рамках клинического исследования предусмотрена консультация врача-пульмонолога, проведение ряда лабораторных и инструментальных обследований, включая спирометрию, КТ органов грудной клетки, тест на диффузионную способность лёгких, ЭКГ.

За подробной информацией по вопросам исследования обращайтесь по телефону 8 (985) 018-47-97 (Виктория Александровна) или отправьте запрос на электронную почту vavilova@cmd.su.

*** ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА**

Клиническое исследование препарата Кипферон®

В исследование приглашаются дети в возрасте от 0 до 7 лет с клинически установленным диагнозом ОРВИ легкой или средней степени тяжести с длительностью симптомов заболевания не более 3 суток.

Исследуемый препарат – Кипферон® (иммуноглобулин человека нормальный [IgG+IgA+IgM] 200мг + Интерферон альфа-2b 500000 МЕ) в форме ректальных суппозиторий.

Продолжительность курса терапии препаратом 5-7 дней. За время исследования предполагается 3 амбулаторных визита пациента в центр и 1 телефонный звонок врача-исследователя.

За подробной информацией обращаться: по телефону 8 (915) 473-91-68 (координатор Сорокина Татьяна Алексеевна).

Клиническое исследование вакцины Гриппол® Квадριвалент

Приглашаются здоровые дети в возрасте от 36 месяцев до 5 лет включительно, не имеющие противопоказаний к вакцинации от гриппа.

Вакцинация будет проведена одной из вакцин: Гриппол® Квадριвалент (вакцина противогриппозная четырехвалентная инактивированная субъединичная адъювантная), раствор для внутримышечного и подкожного введения, 0,5 мл/доза, производства ООО «НПО Петровакс Фарм» или Гриппол® плюс (вакцина противогриппозная трёхвалентная инактивированная полимер-субъединичная), суспензия для внутримышечного и подкожного введения 0,5 мл/доза, производства ООО «НПО Петровакс Фарм».

Исследование будет включать 4 амбулаторных визита в исследовательский центр и 6 телефонных звонков врача-исследователя.

За подробной информацией обращаться: к врачу-педиатру Анохиной Елене Александровне моб. 8 (916) 386-56-09 или по телефону 8 (915) 473-91-68 (координатор Сорокина Татьяна Алексеевна).